



Artículo

Revista digital Matemática, Educación e Internet (<http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/>).

Vol. 12, N° 2. Marzo – Agosto 2012.

Una propuesta para introducir la enseñanza de las Pruebas de Hipótesis

Giovanni Sanabria Brenes.

gsanabria@itcr.ac.cr,

Instituto Tecnológico de Costa Rica – Universidad de Costa Rica

Resumen.

El presente trabajo brinda una propuesta que busca enfrentar el problema de enseñanza de los conceptos asociados a las pruebas de hipótesis. La propuesta plantea varias situaciones problema en forma de ejemplos que permiten reforzar la comprensión de ciertos conceptos asociados a las pruebas de hipótesis.

Palabras clave: Didáctica, Pruebas de hipótesis, Decisión, Errores.

Resumen.

Abstract.

Introducción

Concepto intuitivo

Conceptos básicos

Contraste de . . .

Algunos ejemplos

Bibliografía

[Ir a la Revista](#)

[Inicio](#)

[◀](#) [▶](#)

[◀](#) [▶](#)

[Página 1 de 35](#)

[Buscar](#)

[Pantalla grande](#)

[Guardar](#)

[Imprimir](#)

Abstract.

This paper provides a proposal that seeks to approach the problem of teaching the concepts associated with hypothesis testing. The proposal raises several problem situations, in examples way, to reinforce understanding of certain concepts related to hypothesis testing.

Keywords: Teaching, hypothesis testing, decision, errors.

1.1 Introducción

El contraste de pruebas de hipótesis es una herramienta muy importante a utilizar en las investigaciones cuantitativas para la toma de decisiones. Precisamente su fortaleza está en ayudarnos a tomar las decisiones que no necesariamente son las correctas pero si aquellas que tiene una mayor probabilidad de ser las correctas. Además, el contraste de hipótesis tiene aplicaciones en diversas áreas del conocimiento lo cual contribuye a su importancia.

Sin embargo, la enseñanza de las pruebas de hipótesis presentan varias dificultades, tres de éstas dificultades son detectadas por Vallecillos & Batanero (1997) a partir de un estudio de caso:


1. Involucra un gran número de conceptos que se asume su dominio por parte del estudiante: nivel de significancia, hipótesis nula, hipótesis alternativa, valor P ,...

2. No establece relaciones entre los conceptos, por ejemplo no establecen relación entre la distribución del estadístico, las regiones y el nivel de significación
3. Los estudiantes pueden dar respuestas a los problemas planteados sin conectar los conceptos.

El presente trabajo brinda una propuesta para introducir las pruebas de hipótesis que pretenden superar las dificultades anteriores. Esta propuesta ha sido plasmada en texto que se ha utilizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en los últimos semestres para el curso *MA – 3405 Estadística* y los resultados han sido satisfactorios.

1.2 Concepto intuitivo

Para introducir el concepto de pruebas de hipótesis se tomará como base la propuesta desarrollada por Martha Aliaga (2008). Suponga que se tiene una bolsa con 6 bolas de las cuales no se conoce su color:



Resumen.

Abstract.

Introducción

Concepto intuitivo

Conceptos básicos


Contraste de...

Algunos ejemplos

Bibliografía

Ir a la Revista

Inicio



Página 3 de 35

Buscar


Pantalla grande

Guardar

Imprimir

Una persona realiza la siguiente afirmación: “en la bolsa hay 5 bolas verdes y una blanca” y le solicitan a usted que rechace o acepte la afirmación, para ello le dan la posibilidad de realizar una muestra aleatoria de tamaño 2. Es decir le permiten elegir dos bolas al azar con reposición de la bolsa.

Suponga que al realizar las dos extracciones con reposición obtiene dos bolas blancas:



Con base en la información obtenida en la muestra, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Acepta o rechaza la afirmación de la persona?
2. ¿Hay alguna posibilidad de que se cumpla la afirmación?
3. ¿Considera más probable que la afirmación se correcta o incorrecta?
4. Discuta la diferencia, con respecto a la afirmación, entre la toma de una decisión (aceptar o rechazar la afirmación) y la asignación de un valor de verdad a la afirmación (afirmación correcta o incorrecta).

Suponga que la bolsa fue desechada y nunca se determinó la veracidad de la afirmación, entonces ¿puede asegurar que su decisión fue la correcta o la más probable?.

Cuando se toman decisiones con respecto a la información brindada por una muestra se realiza una prueba de hipótesis. Discuta la diferencia entre una prueba de hipótesis y una prueba matemática.

1.3 Conceptos básicos

1.3.1 Tipos de hipótesis

La investigación define las hipótesis como las afirmaciones que son objeto de estudio y que se desea determinar su veracidad. La prueba de hipótesis es un método de investigación que a partir de una afirmación, sobre el valor de un parámetro, define dos hipótesis opuestas (una de las cuales es la afirmación) y busca evidencias para aceptarlas o rechazarlas. Seguidamente se recuerdan las definiciones de los dos tipos de hipótesis.

Definición 1.1 (Hipótesis nula). (Acusado es inocente). Es una aseveración en el sentido de que un parámetro θ tenga un valor específico θ_0 y se denota H_0 :

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

donde θ_0 es un valor del estadístico $\hat{\Theta}$ llamado valor nulo. El procedimiento consiste en suponer que H_0 es verdadera y buscar evidencias en contra del supuesto. Para que H_0 se acepte no debe haber una fuerte evidencia en su contra.

[Ir a la Revista](#)[Inicio](#)[◀◀](#) [▶▶](#)[◀](#) [▶](#)[Página 5 de 35](#)[Buscar](#)[Pantalla grande](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Definición 1.2 (Hipótesis alternativa). (Acusado es culpable). es una aseveración que se acepta si se rechaza H_0 , se denota por H_1 y tiene la forma:

$$H_1 : \theta < \theta_0, \quad H_1 : \theta > \theta_0 \quad o \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Observaciones: Se tiene que

1. De acuerdo con la ley de tricotomía:

$$\theta = \theta_0, \quad \theta < \theta_0 \quad o \quad \theta > \theta_0$$

H_0 y H_1 deben abordar estas afirmaciones y ser opuestas.

2. Aunque H_0 se redacta en forma de igualdad, en realidad suele ser su caso extremo para que se cumpla. Por ejemplo, si se desea estudiar la afirmación $\theta \leq \theta_0$, entonces, dado que la afirmación debe estar sola en una de las hipótesis para poder analizarla, se tiene que

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad (\leq) \quad H_1 : \theta > \theta_0$$

Observe que la afirmación, dado que contiene la igualdad ($\theta \leq \theta_0$), se le asigna a H_0 . Así, H_0 se acepta si $\theta \leq \theta_0$ y su caso extremo para que se acepte es que $\theta = \theta_0$. Por otro lado, en H_1 se le asigna lo contrario a la afirmación.

3. Recuerde que “*el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario*”. Por lo tanto, hasta el momento el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis consiste en:

[Ir a la Revista](#)
[Inicio](#)
[◀](#)
[▶](#)
[◀](#)
[▶](#)
[Página 6 de 35](#)
[Buscar](#)
[Pantalla grande](#)
[Guardar](#)
[Imprimir](#)

- (a) Definir H_0 y H_1 a partir de la afirmación por analizar
- (b) Asumir H_0 es verdadero, es decir se asume que “*el acusado es inocente*”.
- (c) Tomar una muestra para hallar un valor $\hat{\theta}$ del estadístico $\hat{\Theta}$
- (d) Utilizar la estimación $\hat{\theta}$ y la distribución de $\hat{\Theta}$ para determinar evidencias en contra de H_0 , es decir “*se buscan evidencias que se demuestre lo contrario*”.
- (e) Decisión. Si se determinan evidencias significativas en contra de H_0 , entonces se rechaza H_0 . De lo contrario se acepta H_0 .
- (f) Conclusión. Si se acepta H_0 , no significa que se acepta que “*el acusado es inocente*” sino, al igual que en un juicio, se concluye que no se hallaron evidencias significativas en contra de H_0 . Por otro lado si se rechaza H_0 , se concluye que existe evidencia en contra de H_0 .

Ejemplo 1.1 Para cada una de las siguientes situaciones identifique el parámetro, indique la afirmación a analizar y, con base en esta, identifique la hipótesis nula y alternativa.

1. Se quiere demostrar que el nivel promedio de carbono del centro de San José es mayor que 4.9 partes por millón.

Sea μ el nivel promedio de carbono del centro de San José.

Afirmación : $\mu > 4.9$

$$H_0 : \mu = 4.9 \quad (\leq) \quad H_1 : \mu > 4.9$$

2. Se desea determinar si el porcentaje de costarricenses que duermen con el televisor encendido es menor a 35%.

[Ir a la Revista](#)
[Inicio](#)
[◀](#)
[▶](#)
[◀](#)
[▶](#)
[Página 7 de 35](#)
[Buscar](#)
[Pantalla grande](#)
[Guardar](#)
[Imprimir](#)

Sea p el porcentaje de costarricenses que duermen con el televisor encendido.

Afirmación : $p < 0.35$

$$H_0 : p = 0.35 \quad (\geq) \quad H_1 : p < 0.35$$

Definición 1.3 Una **prueba de una cola** es aquella en la cual H_1 tiene la forma:

$$H_1 : \theta < \theta_0 \quad \text{o} \quad H_1 : \theta > \theta_0$$

Definición 1.4 Una **prueba de dos colas** es aquella en la cual H_1 tiene la forma:

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

1.3.2 Regiones de aceptación y rechazo

La aceptación de H_0 se da si al tomar una muestra no se encuentra evidencia significativa en su contra. Es decir la aceptación de H_0 no está directamente ligada a la posibilidad de que se cumpla H_0 (aunque si indirectamente), más bien su aceptación se da cuando no existan datos en su contra. Por lo tanto, el concepto de aceptación en pruebas de hipótesis es distinto al de la vida cotidiana.

Ejemplo 1.2 Juan afirma que Ana tiene puesta una camisa de color rosada. Se tiene que

H_0 : la camisa que tiene puesta Ana es rosada

H_1 : la camisa que tiene puesta Ana no es rosada

[Ir a la Revista](#)[Inicio](#)[◀▶](#)[◀ ▶](#)[Página 8 de 35](#)[Buscar](#)[Pantalla grande](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Se entrevistan a cuatro personas que vieron Ana: Luis indica que la camisa de Ana no es de color verde, Rebeca dice que no es roja, Alberto que no recuerda el color y Sara indica que no es amarilla. Por lo tanto, dado que la información obtenida no brinda evidencia en contra de H_0 , se acepta que la camisa es rosada, esto pese a que directamente no se obtuvo información de que fuera de dicho color. Así,

se acepta H_0

y lo correcto es concluir que no se hallan evidencias en contra de que sea rosada

Ejemplo 1.3 Considere el ejemplo anterior. Suponga que Anthony afirma que Ana tiene puesta una camisa de color negra. Así,

H_0 : la camisa que tiene puesta Ana es negra

H_1 : la camisa que tiene puesta Ana no es negra

De acuerdo a la información indicada en el ejemplo anterior, no hay evidencia significativa para rechazar H_0 . Por lo tanto,

se acepta que la camisa es negra (1)

Sin embargo, en el ejemplo anterior, se obtuvo que

se acepta que la camisa es rosada (2)

¿Se contradicen (1) y (2)? No, en realidad se acepta que la camisa es negra y que es rosada, al no existir evidencia en contra de ambas afirmaciones. Es decir, la aceptación se da porque no se halló un argumento sólido para negarla.

Los ejemplos anteriores modelan el concepto de aceptación en una prueba de hipótesis e indicar que es posible aceptar dos afirmaciones contradictorias si no evidencia significativa para rechazarlas.

¿Cómo aceptar o rechazar H_0 ? La hipótesis nula realiza una afirmación sobre el valor de un parámetro θ . Recuerde que $\hat{\Theta}$, un buen estimador o estadístico asociado a θ , brinda estimaciones sobre el valor θ a partir de muestras de tamaño fijo. Así, la idea es utilizar una estimación $\hat{\theta}$ de θ y la distribución muestral de $\hat{\Theta}$ para determinar evidencia en contra de H_0 . Por lo tanto, el valor de la estimación de θ es trascendental para aceptar o rechazar H_0 .

Ejemplo 1.4 Se afirma que el promedio de edad de los vendedores del Mercado Central de Cartago es de por lo menos 30 años.

Para analizar esta afirmación, sea μ la edad promedio de los vendedores del Mercado Central de Cartago. Así,

$$\begin{aligned} & \text{afirmación : } \mu \geq 30 \\ H_0 : \mu = 30 \quad (\geq) \quad H_1 : \mu < 30 \end{aligned}$$

El estadístico utilizado es \bar{X} . Recuerde que este estadístico brinda estimaciones de μ para muestras de tamaño 40, por ejemplo.

1. Suponga que en una muestra de tamaño 40 se halló el valor $\bar{x} = 32$. Como \bar{x} es una estimación de μ , esto indica que μ es cercano a 32, y recuerde que H_0 se cumple si $\mu \geq 30$. Así, el valor $\bar{x} = 32$ no representa una evidencia en contra de H_0 , por lo tanto

se acepta H_0 .

2. Suponga que en una muestra de tamaño 40 se halló el valor $\bar{x} = 29$. Esto indica que μ es cercano a 29. Así, se ha determinado evidencia en contra de H_0 . Sin embargo, ¿esta evidencia es significativa?
 - (a) Recuerde que $\bar{x} = 29$ es solo una estimación de μ . Se sabe que μ es cercano a 29, entonces μ puede ser 30 el cual se supone cercano a 29. Por lo tanto, se puede considerar que la evidencia

[Ir a la Revista](#)[Inicio](#)[◀◀](#) [▶▶](#)[◀](#) [▶](#)[Página 10 de 35](#)[Buscar](#)[Pantalla grande](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

no es significativa y

se acepta H_0 .

(b) Por otro lado, se puede considerar que 30 está alejando de 29. Así, la evidencia es significativa y

se rechaza H_0 .

(c) ¿29 es cercano o no a 30? Esto dependerá de la distribución del estadístico \bar{X} y del riesgo de equivocarse que se está dispuesto a asumir. Como se verá más adelante, si se considera que como $\bar{x} = 29.9$ entonces $\mu < 30$ (29.9 está alejado de 30) entonces se está aumentando el riesgo de cometer un error. En general, si estimaciones muy cercanas a 30 pero menores se consideran significativas para rechazar H_0 , se aumenta el riesgo de equivocarse en la decisión tomada.

Continuando con la propuesta, se definen las regiones de una prueba de hipótesis.

Definición 1.5 Dado que

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

se define

- Región de aceptación:** Valores de $\hat{\Theta}$, estimaciones de θ , que aceptan H_0
- Región de rechazo:** Valores de $\hat{\Theta}$, estimaciones de θ , que rechazan H_0
- Valor crítico:** separa una región de rechazo y una de aceptación. Se denota θ_c .

Resumen.

Abstract.

Introducción

Concepto intuitivo

Conceptos básicos

Contraste de ...

Algunos ejemplos

Bibliografía

Ir a la Revista

Inicio

◀▶

◀▶

Página 11 de 35


Buscar

Pantalla grande

Guardar

Imprimir

Aquí es importante que el docente presente las regiones de aceptación y rechazo para cada prueba de hipótesis:



El lector puede notar que hay una tolerancia en cada una de las pruebas para considerar que $\theta = \theta_0$, tolerancia ejemplificada en el ejemplo anterior. De manera general, considere la primera prueba donde H_0 es

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad (\geq)$$

Entonces, para valores del estadístico (estimador de θ) muy cercanos a θ_0 , aunque menores a este valor nulo, se considera que $\theta = \theta_0$ y por lo tanto debe formar parte de la región de aceptación.

Esta tolerancia, que diferencia el valor crítico θ_c y el valor nulo θ_0 , se justifica debido a la utilización del estadístico $\hat{\Theta}$ cuyos valores son estimaciones de θ tomadas de una muestra. Así, si las estimaciones de θ son muy cercanas a θ_0 se puede aceptar que $\theta = \theta_0$.

La distancia entre el valor nulo y el valor crítico dependerá del riesgo que se este dispuesto a tomar al realizar la prueba de hipótesis. Entre más lejanos están estos valores, se considera que estimaciones cercanas a θ_0 aceptan H_0 y hay menos posibilidad de cometer el error de rechazar H_0 siendo verdadera. Esto se estudiará en el siguiente apartado.

Así, la obtención del valor crítico dependerá de la distribución del estadístico y del riesgo que se está dispuesto a asumir al rechazar H_0 siendo verdadera. Esto se verá en el apartado (1.4).


Ejemplo 1.5 Se desea determinar si la proporción p de apartamentos de San José que prohíben mascotas no es superior al 30%.

Se tiene que

$$\text{Afirmación : } p \leq 0.3$$

$$H_0 : p = 0.3 \quad (\leq) \quad H_1 : p > 0.3$$

El estadístico a utilizar es \hat{P} . Las regiones de aceptación y rechazo son



donde p_c es el valor crítico.

1.3.3 Errores en una prueba de hipótesis

Para hablar de los errores de una prueba de hipótesis es común retomar la analogía de estas pruebas con un juicio. Al dictar sentencia en un juicio se pueden cometer dos tipos de errores: declarar culpable al acusado y que sea inocente, declarar inocente al acusado y que sea culpable. Estos dos errores son un modelo para explicar los errores que se pueden cometer cuando se ha realizado una prueba de hipótesis.

Definición 1.6 (Errores de una prueba de hipótesis) Se pueden presentar los siguientes errores:

- a.) **Error tipo I (“Condenar a un inocente”)** la hipótesis nula (“el acusado es inocente”) se rechaza siendo verdadera. La probabilidad del error tipo I se denota por α y es la probabilidad de rechazar H_0 (“se declara culpable al acusado”) sabiendo que H_0 es verdadera (“sabiendo el acusado es inocente”):

$$\alpha = P(H_1|H_0)$$

- b.) **Error tipo II (“Dejar libre al culpable”)** la hipótesis nula se acepta (“el acusado es inocente”) siendo falsa. La probabilidad del error tipo II se denota por β y es la probabilidad de aceptar H_0 (“se declara inocente al acusado”) sabiendo que H_1 es verdadera (“sabiendo que el acusado es culpable”):

$$\beta = P(H_0|H_1)$$

Analicemos la probabilidad del error tipo I (“Condenar a un inocente”):

$$\alpha = P(H_1|H_0)$$

Note que H_1 se acepta (que es equivalente a rechazar H_0) para estimaciones de θ dadas por el estadístico $\hat{\Theta}$ que se encuentran en la región de rechazo. Por otra lado dado que H_0 es verdadera, el caso extremo para que H_0 sea verdadero es que $\theta = \theta_0$. Así

$$\alpha = P(H_1|H_0) = P\left(\hat{\Theta} \text{ este en la región de rechazo} \mid \theta = \theta_0\right)$$

En cuando a la probabilidad del error tipo II (“**Dejar libre al culpable**”):

$$\beta = P(H_0|H_1)$$

Se tiene que H_0 se acepta para estimaciones de θ , dadas por el estadístico $\hat{\Theta}$, que se encuentran en la región de aceptación. Por otro lado, la probabilidad de este tipo de error solo podrá ser analizada para hipótesis alternativas específicas: $H'_1 : \theta = \theta_1$, donde θ_1 es un valor específico de θ para el cual H_1 se cumple. Así la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica: $H'_1 : \theta = \theta_1$ es


$$\beta = P(H_0|H'_1) = P\left(\hat{\Theta} \text{ este en la región de aceptación} \mid \theta = \theta_1\right)$$

Ejemplo 1.6 Suponga que la edad promedio μ de los niños de una cierta comunidad es mayor a 11, y suponga que la hipótesis alternativa específica es $H'_1 : \mu = 12$. Redacte las hipótesis nula y alternativa, identifique el estadístico a utilizar y las regiones de aceptación y rechazo. Además redacte las probabilidades del error tipo I y del error tipo II para la hipótesis alternativa específica dada.

La afirmación es

$$\text{afirmación : } \mu > 11$$

Recuerde que el estadístico asociado a μ es \bar{X} . Así se tiene que



donde las probabilidades de los errores son

$$\begin{aligned} \alpha &= P(H_1|H_0) = P(\bar{X} > \mu_c | \mu = 11) \\ \beta &= P(H_0|H_1') = P(\bar{X} < \mu_c | \mu = 12) \end{aligned}$$

El ejemplo siguiente da evidencia de que α es la medida de la región de rechazo cuando se asume que H_0 es verdadera.


Ejemplo 1.7 Considere la prueba

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad (\geq) \quad H_1 : \theta < \theta_0$$


En este caso, la probabilidad del error tipo I es

$$\alpha = P(H_1|H_0) = P(\hat{\Theta} < \theta_c | \theta = \theta_0)$$

Así, α es el área acumulada bajo la distribución de $\hat{\Theta}$ hasta el valor crítico si se supone que $\theta = \theta_0$:



Por simplicidad se bosqueja la distribución de $\hat{\Theta}$ como una línea horizontal. Sin embargo, el lector debe ser consciente de este hecho, por ejemplo si $\hat{\Theta}$ es normal entonces realmente se tiene que



Teorema 1.1 La probabilidad del error Tipo I es la medida de la región o regiones de rechazo, asumiendo la hipótesis nula.


El error tipo I es mayor cuando el valor crítico θ_c es cercano al valor nulo θ_0 , pues aumenta la posibilidad de que estimaciones de θ cercanas a θ_0 sean consideradas significativas para rechazar H_0 , corriendo el riesgo de que H_0 se verdadera. Véase esto en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.8 Se quiere concluir que la varianza σ^2 en la duración de las llantas Fire es igual a 1000 km^2 .

En este caso, se tiene que la afirmación es

$$\text{afirmación : } \sigma^2 = 1000$$

Recuerde que el estadístico asociado a σ^2 es S^2 . Así se tiene que




$$H_0 : \sigma^2 = 1000 \quad (\leq)$$

$$H_1 : \sigma^2 \neq 1000$$


Suponga que en una muestra se determinó una estimación de σ^2 : $s^2 = 1005$. ¿Es esta estimación significativa para rechazar H_0 ? Veamos las siguientes opciones:

1. Si los valores críticos están alejados del valor nulo σ_0^2 . Suponga que por algún método, que se verá más adelante, se determinan los valores críticos $\sigma_{c1}^2 = 990$ y $\sigma_{c2}^2 = 1010$:



Dado que s^2 está en la región de aceptación, entonces no se considera significativo para rechazar H_0 . Por lo tanto se acepta H_0 .

2. Si los valores críticos están cercanos del valor nulo σ_0^2 . Suponga que los valores críticos son $\sigma_{c1}^2 = 996$ y $\sigma_{c2}^2 = 1004$:



Dado que s^2 está en la región de rechazo, entonces se considera evidencia significativa en contra de H_0 . Por lo tanto se rechaza H_0 .

[Ir a la Revista](#)
[Inicio](#)
[◀](#)
[▶](#)
[◀](#)
[▶](#)

Página 18 de 35

[Buscar](#)
[Pantalla grande](#)
[Guardar](#)
[Imprimir](#)

Comparando estas opciones, se puede notar que el error tipo I es mayor en (2) esto pues:

- (a) En (2) aumenta la probabilidad de que estimaciones como 1005 y 1004.1 sean consideradas significativas para rechazar H_0 , esto no ocurre en (1). Así, en (2) hay más posibilidad de rechazar H_0 y por lo tanto de cometer el error tipo I.
- (b) Utilizando el teorema anterior, las regiones de rechazo son mayor en (2) que en (1), por lo tanto el error tipo I es mayor en (2).

En cierta medida los errores son opuestos, si se tratada de evitar el error tipo I (“*Condenar a un inocente*”) se puede caer en el error tipo II (“*Dejar libre al culpable*”). Esto hace que, solo se pueda controlar uno de los errores, el más grave.

¿Cuál de los errores es más grave? En un juicio se prefiere dejar libre a un culpable que condenar un inocente, es decir se considera más grave condenar a un inocente. Recuerde que “*el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario*”, entonces se controla el error tipo I, se acepta inicialmente H_0 (“*el acusada es inocente*”) y si no hay realmente evidencia significativa para rechazar H_0 , se prefiere “*dejar libre al acusado*” y evitar el error tipo I.

Así, en pruebas de hipótesis se controla el error tipo I por medio del nivel de significancia, que se recuerda seguidamente.

Definición 1.7 Nivel de significancia: es el valor máximo aceptable para α , la probabilidad de que ocurra el error tipo I.

Por lo general, el nivel de significancia de una prueba es dado. Note que formalmente este valor no es la probabilidad α del error tipo I, sino una cota superior para α . Sin embargo, si se considera α igual al nivel


[Ir a la Revista](#)[Inicio](#)[◀▶](#)[◀▶](#)[Página 19 de 35](#)[Buscar](#)[Pantalla grande](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

de significancia, entonces θ_c será el valor crítico permitido que genere el máximo error tipo I aceptable y por lo tanto el más cercano a θ_0 . Además, bajo esta consideración, el nivel de significancia es la medida de la región de rechazo.

Ejemplo 1.9 Considere la prueba

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad (\geq) \quad H_1 : \theta < \theta_0$$


Denotemos con δ el nivel de significancia y con α la probabilidad del error tipo I. Se tiene que



Note que entre más cerca esté θ_c de θ_0 , como se comentó anteriormente, aumenta la probabilidad de cometer el error tipo I. Esto se debe a que se reduce la tolerancia para aceptar que $\theta = \theta_0$ a partir de estimaciones de θ . Por otro lado, lo más cerca que puede estar θ_c de θ_0 es cuanto el error tipo I ha llegado a su máximo permitido, esto sucede si $\alpha = \delta$.

El nivel de significancia es escogido dependiendo de las exigencias con respecto al error tipo I. Como se ha mencionado, las pruebas de hipótesis que se estudiarán asumen un nivel de significancia y por lo tanto controlan el error tipo I. Por el contrario el error tipo II no puede controlarse en general y solo puede calcularse para valores específicos de H_1 .

Ejemplo 1.10 Considere la siguiente prueba de hipótesis



donde $\theta_c = 6.3$ y además $\hat{\Theta} \sim N(\theta, 0.7)$. En este caso, la probabilidad del error tipo I es

$$\begin{aligned}\alpha &= P(H_1|H_0) = P(\hat{\Theta} > 6.3|\theta = 6) = P\left(Z > \frac{6.3 - 6}{\sqrt{0.7}}\right) \\ &= P(Z > 0.358569) \approx 0.359424 = 35.9424\%.\end{aligned}$$

Por otro lado, la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica $H_1' : \theta = 6.5$ es

$$\begin{aligned}\beta &= P(H_0|H_1') = P(\hat{\Theta} < 6.3|\theta = 6.5) = P\left(Z < \frac{6.3 - 6.5}{\sqrt{0.7}}\right) \\ &= P(Z < -0.239046) \approx 0.405165 = 40.5165\%\end{aligned}$$

Como se mencionó los errores son en cierta medida opuestos. Dada que el valor contralado es α , entonces sucede uno de los siguientes efectos: si se disminuye α entonces aumenta β , si se aumenta α entonces

[Ir a la Revista](#)
[Inicio](#)
[◀](#)
[▶](#)
[◀](#)
[▶](#)

Página 21 de 35

[Buscar](#)
[Pantalla grande](#)
[Guardar](#)
[Imprimir](#)

disminuye β . Sin embargo, se pueden disminuir ambos si se aumenta el tamaño de la muestra, de la cual se obtiene la estimación de θ . Esto se verá más adelante para ciertas pruebas de hipótesis.

1.4 Contraste de hipótesis

¿Cómo realizar una prueba de hipótesis? Para realizar el contraste de hipótesis existen dos enfoques que se explican seguidamente.

1.4.1 Determinación de regiones

Este enfoque, llamado por algunos autores como enfoque clásico consiste en hallar el o los valores críticos a partir del nivel de significancia dado. El enfoque sigue los siguientes pasos

Paso 1. Redactar H_0 y H_1

Paso 2. Especificar el criterio de prueba o contraste:

- a) Nivel de significancia α
- b) Distribución muestral de $\hat{\Theta}$
- c) Identificar las regiones de aceptación y rechazo tomando α como la probabilidad del error tipo I

Como se discutió antes, al tomar el nivel de significancia como la probabilidad del error tipo I, se está analizando el caso límite en que es más probable cometer el error de rechazar $H_0 : \theta = \theta_0$ para estimaciones de θ cercanas a θ_0 .

[Ir a la Revista](#)[Inicio](#)[◀](#) [▶](#)[◀](#) [▶](#)[Página 22 de 35](#)[Buscar](#)[Pantalla grande](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Paso 3. Determinar el o los valores críticos, de acuerdo a el criterio de contraste (paso 2). Para ello, se redacta la probabilidad del error tipo I.

Paso 4. Datos muestrales: hallar un valor $\hat{\theta}$ de $\hat{\Theta}$

Paso 5. Decisión. Sea R la región de rechazo

Si $\hat{\theta} \in R$ entonces se rechaza H_0

Si $\hat{\theta} \notin R$ entonces se acepta H_0

Paso 6. Conclusión

Si se rechaza H_0 , se dice que si hay evidencia para rechazarla

Si se acepta H_0 , se dice que no hay evidencia significativa en contra de H_0

Ejemplo 1.11 Dada una población se afirma que uno de sus parámetros θ no es menor a 4. Suponga que el estadístico $\hat{\Theta}$ asociado a θ se distribuye normalmente

$$\hat{\Theta} \sim N(\theta, 0.25)$$

para muestras de un tamaño n . Además, para una muestra de ese tamaño se observo un valor del estadístico de $\hat{\theta} = 3$. Realice el contraste de hipótesis utilizando el enfoque clásico con un nivel de significancia de 0.1.


1. **Redacción** de H_0 y H_1

Afirmación: $\theta \geq 4$

$$H_0 : \theta = 4 (\geq), \quad H_1 : \theta < 4$$

2. Criterio de contraste:

- Nivel de significancia $\alpha = 0.1$
- Distribución muestral de $\hat{\Theta} \sim N$



3. Determinación del valor crítico

$$0.1 = \alpha = P(H_1|H_0) = P(\hat{\Theta} < \theta_c | \theta = 4) = P\left(Z < \frac{\theta_c - 4}{\sqrt{0.25}}\right)$$

Así

$$P\left(Z < \frac{\theta_c - 4}{\sqrt{0.25}}\right) = 0.1 \implies \frac{\theta_c - 4}{\sqrt{0.25}} = -1.28 \implies \theta_c \approx 3.36$$

Por lo tanto las regiones son

$$\text{Región de Aceptación: } A =]3.36, +\infty[, \quad \text{Región de Rechazo: } R =]-\infty, 3.36[$$

- Datos muestrales:** $\hat{\theta} = 3$.
- Decisión.** Como $\hat{\theta} = 3 \in R$ entonces se rechaza H_0 .
- Conclusión.** Hay evidencia significativa para rechazar H_0 . Dado que la afirmación se encuentra en H_0 , entonces hay evidencia significativa para rechazar la afirmación.

Resumen.

Abstract.

Introducción

Concepto intuitivo

Conceptos básicos

Contraste de...

Algunos ejemplos

Bibliografía

Ir a la Revista

Inicio

◀ ▶

◀ ▶

Página 24 de 35

Buscar

Pantalla grande

Guardar

Imprimir

1.4.2 Valor P de la prueba

Definición 1.8 El valor P de una prueba de hipótesis es la probabilidad de que el estadístico $\hat{\Theta}$ tenga el valor observado en la muestra o un valor extremo (en dirección de H_1) cuando H_0 es verdadera. Es decir es el nivel de significancia más bajo en el que el valor observado es significativo para rechazar H_0 .

En otras palabras, el valor P , indica el valor mínimo de la posibilidad de que ocurra el error tipo I cuando el valor observado se considera parte de la región de rechazo. Note que el valor P está relacionado con el

[Resumen.](#)

[Abstract.](#)

[Introducción](#)

[Concepto intuitivo](#)

[Conceptos básicos](#)

[Contraste de ...](#)

[Algunos ejemplos](#)

[Bibliografía](#)

[Ir a la Revista](#)

[Inicio](#)

[◀◀](#) [▶▶](#)

[◀](#) [▶](#)

[Página 25 de 35](#)


[Buscar](#)

[Pantalla grande](#)

[Guardar](#)

[Imprimir](#)

nivel de significancia. La redacción del valor P depende del tipo de prueba:

Hipótesis	Valor P
$H_0 : \theta = \theta_0 \quad (\geq)$ $H_1 : \theta < \theta_0$	$P(\hat{\Theta} \leq \hat{\theta} \mid H_0)$
$H_0 : \theta = \theta_0 \quad (\leq)$ $H_1 : \theta > \theta_0$	$P(\hat{\Theta} \geq \hat{\theta} \mid H_0)$
$H_0 : \theta = \theta_0$ $H_1 : \theta \neq \theta_0$	<p>Sean a y b los valores dador por el valor observado $\hat{\theta}$ y su simétrico respecto a θ_0 :</p>  <p>Valor $P = P(\hat{\Theta} < a \mid H_0) + P(\hat{\Theta} > b \mid H_0)$</p> <p>Así, si $\hat{\Theta}$ tiene una distribución simétrica respecto a θ_0 entonces:</p> $\text{Valor } P = \begin{cases} 2P(\hat{\Theta} < \hat{\theta} \mid H_0) & \text{si } \hat{\theta} < \theta_0 \\ 2P(\hat{\Theta} > \hat{\theta} \mid H_0) & \text{si } \hat{\theta} > \theta_0 \end{cases}$

Ir a la Revista

Inicio



Página 26 de 35

Buscar

Pantalla grande

Guardar

Imprimir

Ejemplo 1.12 Se afirma que $\mu > 5$. y se observa una muestra un valor de $\bar{x} = 4.5$. Entonces se tiene que

Afirmación: $\mu > 5$

$$H_0 : \mu = 5 (\leq), \quad H_1 : \mu > 5$$

$$\text{Valor } P = P(\hat{\Theta} \geq \hat{\theta} \mid H_0) = P(\bar{X} \geq 4.5 \mid \mu = 5)$$

Para este enfoque se siguen los siguientes pasos

Paso 1. Redactar H_0 y H_1

Paso 2. Valor observado (datos muestrales): hallar un valor $\hat{\theta}$ de $\hat{\Theta}$


Paso 3. Redacción y determinación del valor P .

Paso 4. Decisión.

a) **Si se conoce el nivel de significancia α .**

a.1) **Si el valor P es menor o igual a α .** Aceptando H_0 , se tiene que la probabilidad de que $\hat{\Theta}$ tenga el valor observado en dirección a H_1 es menor que α , el área de la región de rechazo, por ejemplo

[Ir a la Revista](#)[Inicio](#)[◀▶](#)[◀▶](#)[Página 27 de 35](#)[Buscar](#)[Pantalla grande](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)



Por lo tanto, el valor observado está en la región de rechazo y se rechaza H_0 .

a.2) **Si el valor P es mayor a α .** En este caso, por justificaciones similares, se acepta H_0 .

En resumen:

Si el Valor $P \leq \alpha$ entonces se rechaza H_0

Si el Valor $P > \alpha$ entonces se acepta H_0

b) **Si no se conoce el nivel de significancia α .** Se utiliza $\alpha = 0.05$.

Paso 5. Conclusión

Si se rechaza H_0 , se dice que si hay evidencia para rechazarla

Si se acepta H_0 , se dice que no hay evidencia significativa a favor de H_1

[Ir a la Revista](#)

[Inicio](#)

[◀](#) [▶](#)

[◀](#) [▶](#)

[Página 28 de 35](#)

[Buscar](#)

[Pantalla grande](#)

[Guardar](#)

[Imprimir](#)

Ejemplo 1.13 Dada una población se afirma que uno de sus parámetros θ no es menor a 4. Suponga que el estadístico $\hat{\Theta}$ asociado a θ se distribuye normalmente

$$\hat{\Theta} \sim N(\theta, 0.25)$$

para muestras de un tamaño n . Además para una muestra de ese tamaño se observó un valor del estadístico de $\hat{\theta} = 3$. Realice el contraste de hipótesis utilizando Valor P con un nivel de significancia de 0.1.

1. **Redacción** de H_0 y H_1

$$\begin{aligned} \text{Afirmación: } & \theta \geq 4 \\ H_0: \theta &= 4 (\geq), \quad H_1: \theta < 4 \end{aligned}$$

2. **Valor observado:** $\hat{\theta} = 3$.

3. **Valor P :**

$$\text{Valor } P = P(\hat{\Theta} \leq 3 | \theta = 4) = P\left(Z \leq \frac{3 - 4}{\sqrt{0.25}}\right) = P(Z \leq -2) = 0.022750$$

4. **Decisión.** Como $\text{Valor } P < 0.1 = \alpha$ entonces se rechaza H_0 .
5. **Conclusión.** Hay evidencia para rechazar H_0 , y como la afirmación se encuentra en H_0 , se rechaza la afirmación.

1.4.3 Cuál de los dos enfoques utilizar?

[Ir a la Revista](#)
[Inicio](#)


Página 29 de 35

[Buscar](#)
[Pantalla grande](#)
[Guardar](#)
[Imprimir](#)

Ambos enfoques son equivalentes; sin embargo, al compararlos se tiene que

Enfoque	Utilización de valor muestral $\hat{\theta}$	Utilización del nivel de significancia α
Determinación de regiones	Al final, para ver en qué región se encuentra $\hat{\theta}$	Al inicio, para calcular las regiones
Valor P	Al inicio, para calcular el Valor P	Al final, al comparar α y el Valor P

Así se tiene que

1. Se utiliza el valor P cuando se conoce el valor muestral y no se tiene certeza sobre cuál nivel de significancia utilizar. Por ejemplo, si el valor P es 0.007, indica que se puede utilizar un nivel de significancia bastante pequeño para rechazar la hipótesis como 0.01 en lugar de utilizar un nivel de significancia a priori del 10% por ejemplo. Note que al reportar un valor pequeño de α en una prueba que se rechaza, la conclusión tiene una mejor aceptación. Particularmente el valor P es útil cuando se tiene un valor muestral difícil de volver a conseguir, ya sea por razones económicas o de tiempo y se quiere manipular el nivel de significancia.
2. Se utiliza la determinación de regiones cuando aún no se tiene el valor muestral y se tiene certeza del nivel de significancia a utilizar. Así, con el nivel de confianza se pueden determinar las regiones de prueba y luego tomar la muestra para obtener un valor muestral y ubicarlo en alguna de las regiones. Se puede dar un efecto negativo y no ético de la estadística, que es la manipulación del valor muestral para ajustarlo a conveniencia.

Para fines prácticos de este documento, se utiliza el valor P cuando el ejercicio no indique el nivel de significancia a utilizar. En caso contrario, el lector puede escoger el enfoque a utilizar.

[Ir a la Revista](#)[Inicio](#)[◀▶](#)[◀▶](#)[Página 30 de 35](#)[Buscar](#)[Pantalla grande](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

1.5 Algunos ejemplos

Considere la población dada por la variable aleatoria X que con media poblacional μ y varianza poblacional σ^2 . En las pruebas de un promedio la hipótesis nula es de la forma

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

Si \bar{X} sigue una distribución normal para muestras de tamaño n (la población X es normal o $n \geq 30$) y se conoce σ entonces

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2) \implies Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

y bajo la hipótesis $H_0 : \mu = \mu_0$, se tiene que

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

sigue una distribución normal estándar.¹


Ejemplo 1.14 (¿La directiva tiene razón?). El sindicato de empleados de una empresa ubicada en una zona rural ha solicitado que la hora de entrada sea a las 7:15am y no a las 7:00 am, esto debido a que la mayoría de los empleados no viven cerca de la empresa. La directiva ha denegado la solicitud pues

¹En realidad, si $X \sim N$ entonces \bar{X} sigue una distribución normal. Pero si $n \geq 30$ entonces \bar{X} sigue una distribución que se aproxima a la normal, esto se denota $\bar{X} \underset{aprox}{\sim} N$.

considera que el empleado promedio no recorre más de 9 kilómetros diariamente para llegar a la empresa. Se desea contrastar la afirmación emitida por dicha directiva con un nivel de significancia de 0.05. Para ello, en una muestra de 50 empleados se observó un recorrido promedio de 9.1 km con una desviación estándar de 5 km.

1. Plantee la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y las regiones de aceptación y rechazo.

Sea μ la distancia promedio, en kilómetros, que recorre diariamente el empleado para llegar a la empresa.



2. Determine las regiones de aceptación y rechazo.

Dado que el tamaño de muestra es $n = 50$ entonces

$$\bar{X} \underset{\text{aprox}}{\sim} N \quad \text{y} \quad \sigma \approx s = 5$$

Además $\alpha = 0.05$, por lo tanto

$$\begin{aligned} & \alpha = P(H_1|H_0) \\ \implies & 0.05 = P(\bar{X} \geq \mu_c | \mu = 9) = P\left(Z > \frac{\mu_c - 9}{5/\sqrt{50}}\right) \\ \implies & \frac{\mu_c - 9}{5/\sqrt{50}} = z_{0.95} = 1.645 \\ \implies & \mu_c = 10.167 \end{aligned}$$

[Ir a la Revista](#)
[Inicio](#)
[◀](#)
[▶](#)
[◀](#)
[▶](#)

Página 32 de 35

[Buscar](#)
[Pantalla grande](#)
[Guardar](#)
[Imprimir](#)

Región de rechazo: $R =]10.1632, +\infty[$ y Región de aceptación: $A =]-\infty, 10.1632[$.

3. ¿Hay evidencia en contra de la afirmación de la directiva?

El valor observado es $\bar{x} = 9.1$, como $\bar{x} \in A$ entonces se acepta H_0 . Dado que la afirmación de la directiva fue ubicada en H_0 , entonces se acepta la afirmación, por lo tanto no se encontró evidencia significativa en contra de lo expresado por la directiva.

Ejemplo 1.15 (¿El sindicato tiene razón?). Considere el ejemplo anterior. Ante lo expresado por la directiva, el sindicato señala que el empleado promedio recorre al menos 9.2 km para llegar a la empresa. Utilizando los mismos datos del ejemplo anterior, ¿aceptaría la afirmación del sindicato?

Note que la afirmación de la directiva ($\mu \leq 9$) es opuesta a la afirmación del sindicato ($\mu \geq 9.2$). Como la afirmación de la directiva se considera aceptable (ejemplo anterior), se puede cometer el error de rechazar la afirmación del sindicato. En pruebas de hipótesis, cada afirmación debe ser analizada por separado. Analicemos la afirmación del sindicato

$$\begin{aligned} \text{Afirmación: } & \mu \geq 9.2 \\ H_0 : \mu &= 9.2 (\geq), \quad H_1 : \mu < 9.2 \end{aligned}$$

Como $n = 50$ entonces $\bar{X} \underset{\text{aprox}}{\sim} N$ y $\sigma \approx s = 5$. Entonces el valor P de la prueba es

$$\begin{aligned} \text{Valor } P &= P(\bar{X} \leq \bar{x} | H_0) = P(\bar{X} \leq 9.1 | \mu = 9.2) \\ &= P\left(Z \leq \frac{9.1 - 9.2}{5/\sqrt{50}}\right) = P(Z \leq -0.141421) \\ &= 0.444330 \end{aligned}$$

[Ir a la Revista](#)
[Inicio](#)
[◀◀](#)
[▶▶](#)
[◀](#)
[▶](#)

Página 33 de 35

[Buscar](#)
[Pantalla grande](#)
[Guardar](#)
[Imprimir](#)

Dado que el Valor $P > 0.05$, se acepta H_0 y entonces se acepta la afirmación. Por lo tanto, no hay evidencia significativa para rechazar la afirmación del sindicato

Ejemplo 1.16 (¿La directiva o el sindicato?). En los ejemplos anteriores, se aceptan las afirmaciones de la directiva de la empresa y del sindicato, pero estas afirmaciones son contradictorias, ¿qué está sucediendo?

Lo que sucede es que la información muestral es insuficiente para rechazar alguna de las afirmaciones. Además se debe recordar que el concepto de aceptación en pruebas de hipótesis es distinto al usado comúnmente, ambas afirmaciones se aceptan porque no hay evidencias significativas en contra. Aquí se recomienda hacer el estudio con una nueva muestra.

Bibliografía

- [1] Acuña, Luis. *Estadística Aplicada con Fathom*. Editorial Tecnológica de Costa Rica: Cartago, Costa Rica. 2004.
- [2] Aliaga, Martha. *Estadística Interactiva*. Encuentro Latinoamericano de Educación Estadística (ELEE). 4 y 5 de Julio de 2008 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. 2008.
- [3] Antibí, André. *Didáctica de las Matemáticas: Métodos de Resolución de problemas*. Editorial Serie Cabécar: San José, Costa Rica. 2000.
- [4] Devore, Jay. *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, Cuarta edición*. International Thomson Editores: México. 1998.
- [5] Gómez, Miguel. *Elementos de estadística descriptiva*. EUNED: San José, Costa Rica. 2000.

[Ir a la Revista](#)[Inicio](#)[◀](#) [▶](#)[◀](#) [▶](#)[Página 34 de 35](#)[Buscar](#)[Pantalla grande](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

- [6] Mora, Eric. *Curso Intermedio de Probabilidades*. Editorial de la Universidad de Costa Rica: San José, Costa Rica. 2010.
- [7] Sanabria, Giovanni. *Tópicos precedentes al estudio de la Teoría de Probabilidades, II semestre del 2007*. Publicaciones ITCR. 2007.
- [8] Sanabria, Giovanni. *Una propuesta para la enseñanza de los Elementos de Análisis Combinatorio*. Memorias del Primer Encuentro Nacional en la Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística (1° ENEPE), Puebla – México del 16 al 18 de junio del 2010.
- [9] Sanabria, Giovanni. *Comprendiendo la Estadística Inferencial*. Editorial Tecnológica de Costa Rica: Cartago, Costa Rica. 2011.
- [10] Walpole, Ronald; Myers, Raymond; Myers, Sharon. *Probabilidad y estadística para ingenieros*, Sexta edición. Prentice-Hall Hispanoamericana. S.A: México. 1999.
- [11] Vallecillos, A., y Batanero, C. *Análisis del aprendizaje de conceptos clave en el contraste de hipótesis estadísticas mediante el estudio de casos*. Recherches en Didactique des Mathématiques, 17(1), 29-48. 1997.

Resumen.

Abstract.

Introducción

Concepto intuitivo

Conceptos básicos

Contraste de . . .

Algunos ejemplos

Bibliografía

Ir a la Revista

Inicio



Página 35 de 35

Buscar

Pantalla grande

Guardar

Imprimir